



# اثر پروتئین هیدرولیز شده، ویتامین E و روغن اکسید شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و کیفیت لاشه‌ی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

اسفندیار نجفی حاجیپور<sup>۱\*</sup>، سید ولی حسینی<sup>۲</sup>، حمید فرحمنند<sup>۳</sup>، باقر مجازی امیری<sup>۳</sup>، مهدی سلطانی<sup>۴</sup>

۱. دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۲. دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۳. استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۴. استاد گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

## چکیده

ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان در قالب طرح کاملاً تصادفی (شش تیمار و سه تکرار) توسط خوراک حاوی روغن تازه‌ی ماهی کیلکا و ۵۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم (۱ بدون تیمار شاهد A، FO50 یا ۲) با پروتئین هیدرولیز (۴ درصد جایگزین پودر ماهی) (تیمار B، FO50HP، ۵۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم و روغن اکسید شده ۳) بدون تیمار C، (OO50 و ۴) با پروتئین هیدرولیز (تیمار D، OO50HP، ۲۵۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم و روغن اکسید شده ۵) بدون تیمار E، (OO250 یا ۶) با پروتئین هیدرولیز (تیمار F، OO250HP به مدت هشت هفته تغذیه شدند. پایین ترین و بالاترین FCR در تیمارهای B و E حاصل شد (۰/۰۵). >P مقادیر دیگر شاخص‌های رشد در تیمارهای A و B بیش از دیگر تیمارها بودند (۰/۰۵). >P بالاترین و پایین ترین میزان آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) به ترتیب در تیمار C و تیمارهای A و B (05/0 >P)، بالاترین و پایین ترین میزان آسپارات آمینو ترانسفراز (AST) به ترتیب در تیمارهای C و D و تیمار B (05/0 >P) مشاهده شد. بیشترین درصد نوتروفیل‌ها (Nüt) و کمترین درصد لنفوسیت‌ها (Lym) در تیمار E و عکس آن در تیمار C حاصل شد (۰/۰۵). >P بالاترین میزان فاگوسیتوز در تیمارهای C و D و پایین ترین آن در تیمار A ایجاد شد (۰/۰۵). >P بیشترین مقدار اسید چرب غیر اشباع ۹-5:14 n1-سیس-اسید تتراد سنوئیک) فیله در تیمار F و کمترین مقدار در تیمار B بود (۰/۰۵). >P بالاترین میزان ۱۸۰۰ (اسید استئاریک) فیله در تیمار A و پایین ترین میزان در تیمار D بود (۰/۰۵). >P بیشترین مقدار ۶:20 n4-فیله (اسید آراشیدونیک) در تیمار D و کمترین مقدار در تیمار F بود (۰/۰۵). >P طبق نتایج این پژوهش، ویتامین E (50 میلی گرم در کیلوگرم) همراه با پروتئین هیدرولیز (۴ درصد جایگزین پودر ماهی) می‌تواند از آسیب‌های استرس اکسیداتیو ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پروراری جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: ماهی قزل‌آلای رنگین کمان، ویتامین E، پروتئین هیدرولیز، روغن اکسید شده، استرس اکسیداتیو



## **The effect of hydrolyzed protein, vitamin E and oxidized oil on growth performance, hematology and fillet quality of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*)**

**Esfandiar Najafi Hajipour<sup>1\*</sup>, Seyed Vali Hosseini<sup>2</sup>, Hamid Farahmand<sup>3</sup>,  
Bagher Mojazi Amiri<sup>3</sup>, Mahdi Soltani<sup>4</sup>**

1. Ph.D student, Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2. Associate Professor, Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3. professor, Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
4. Professor, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

**Received: 10-Jan-2020**

**Accepted: 06-Feb-2020**

### **Abstract**

Rainbow trout fish fed one of the diets containing fresh kilka oil with 50 mg kg<sup>-1</sup> of vitamin E 1) without (control A, FO50) or 2) with hydrolyzed protein (4% replacement for fishmeal) (treatment B, FO50HP), 50 mg kg<sup>-1</sup> vitamin E with oxidized oil 3) without (treatment C, OO50) or 4) with hydrolyzed protein (treatment D, OO50Hp), 250 mg kg<sup>-1</sup> vitamin E with oxidized oil 5) without (treatment E, OO250) or 6) with hydrolyzed protein (treatment F, OO250HP) in a completely randomized design (six treatments and three replications) for eight weeks. The lowest FCR was in treatment B and the highest was in treatment E ( $P < 0.05$ ). The amount of other growth indices were higher ( $P < 0.05$ ) in treatments A and B than other treatments. The highest and lowest concentrations of alanin amino transferase (ALT) occurred respectively in treatment C and treatments A and B ( $P < 0.05$ ), the highest and lowest concentrations of aspartate amino transferase (AST) occurred in treatments C and D and treatment B ( $P < 0.05$ ), respectively. The highest neutrophil (Nut) and the lowest lymphosit (Lym) percentages were in treatment E while the vise versa were observed in treatment C ( $P < 0.05$ ). The phagocytosis amount was highest in treatments C and D while it was the lowest in treatment A ( $P < 0.05$ ). The fillet 14: 1n-9 concentration was the highest in treatment F while it was the lowest in treatment B ( $P < 0.05$ ). The fillet 18: 0 content was the highest in treatment A and the lowest in treatment D ( $P < 0.05$ ). Treatment D showed the highest fillet 20: 4n-6 content while treatment F had the lowest content ( $P < 0.05$ ). Accordingly, vitamin E (50 mg kg<sup>-1</sup> diet) with hydrolyzed protein (as a substitute for fish meal by 4%) would be able to prohibit the damages resulting from oxidative stress in growing rainbow trout.

**Key words:** Rainbow trout, vitamin E, hydrolyzed protein, oxidized oil, oxidative stress.

esfandyar.najafi@gmail.com

## ۱. مقدمه

ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده ماهی قزل آلائی رنگین کمان محسوب می شود. سازمان شیلات ایران در سالنامه آماری که منتشر نموده میزان تولید ماهی قزل آلائی رنگین کمان کشور در سال ۱۳۹۸ را ۱۶۷۰۰۰ تن اعلام کرده است که به طور تقریبی حدود ۲۱ درصد تولید دنیا را شامل می شود. بر اساس گزارش منتشر شده از فائو ایران در سال ۱۳۹۸ رتبه‌ی یک تولید این ماهی را در جهان به خود اختصاص داده است.

ماهی قزل آلائی رنگین کمان یک ماهی گوشت خوارست (Klontz, 1991; Smith, 1991;) و (Behnke, 1992; Delaney, 2005; Van Hulle, 2005) و جیره‌های غذایی این ماهی نیز دارای پروتئین بالا است که این پروتئین عمدتاً از منابع پروتئینی جانوران دریایی بخصوص پودر ماهی تامین می شود. طبق گزارش انجمن سویای آمریکا میزان پروتئین موجود در خوراک این ماهی طی سال‌های ۱۹۷۰ الی ۲۰۰۰ حدود ۸ درصد و چربی بالغ بر ۱۴ درصد افزایش داشته است، که این امر نشان از مصرف بیشتر منابع پروتئینی و به خصوص پودر ماهی توسط صنعت پرورش قزل آلا دارد. همچنین، در این گزارش عنوان شده است که جیره‌های استاندارد معرفی شده برای ماهی قزل آلا معمولاً دارای ۲۵-۲۲ درصد پودر ماهی است، که به طور تقریبی می‌توان گفت این صنعت در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/۵ درصد از کل پودر ماهی تولیدی در دنیا را به خود اختصاص داده است. این میزان حجم بسیار زیادی بوده و با توجه به گسترش روز افزون صنعت آبرزی پروری وابسته به خوراک، یکی از چالش‌های جدی پرورش ماهی قزل آلا تامین منابع پروتئینی جیره و به خصوص پودر ماهی می‌باشد.

یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، اثر اکسیداسیون چربی جیره بر سیستم آنتی اکسیدانی ماهیان، راهکارهای کاهش آسیب‌های اکسیداتیو ایجاد شده در اثر اکسیداسیون چربی‌ها و شناخت دقیق تر مکانیسم‌های درگیر در این خصوص

است. به خصوص برای ماهیان گوشت خوار که مقادیر بالایی از روغن ماهی دریافت نموده و این روغن به دلیل داشتن مقادیر بالای اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتر در معرض اکسیداسیون است. اکسیداسیون چربی جیره یکی از نگرانی‌های کارخانه‌های تولید کننده خوراک و تولید کنندگان ماهی است. بافت ماهی نیز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از اسیدهای چرب غیر اشباع PUFA سری n-3، نسبت به پستانداران بیشتر در معرض مشکلات پراکسیداسیون است.

اسیدهای چرب PUFA وقتی که در معرض اکسیداسیون، یون‌های فلزات انتقالی (عناصر واسطه به خصوص مس و آهن)، آنزیم‌های لپوکسیژناز، نور و هموپروتئین‌ها قرار می‌گیرند، تمایل به اکسید شدن دارند. اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره نسبت به پراکسیداسیون بسیار حساس اند (Howell et al., 1988) و این امر سبب بوی نامطبوع روغن‌ها می‌گردد (Hamre, 2011). به علاوه، محصولات اکسیداسیون و پراکسیداسیون چربی‌ها برای ارزش تغذیه‌ای جیره و سلامت ماهیان مخرب بوده و نتیجه‌ی آن آسیب‌های اکسیداتیو است.

به منظور کاهش یا متوقف کردن اکسیداسیون چربی‌ها در نهاده‌های اولیه‌ی غذایی، خوراک‌ها و نیز بافت ماهی از آنتی اکسیدان‌ها به صورت گسترده در صنعت خوراک آبزیان استفاده می‌شود. استفاده از آنتی اکسیدان‌های طبیعی، کارآمد و مقرون به صرفه به منظور جایگزین کردن با آنتی اکسیدان‌های مصنوعی و کاهش اثرات استرس اکسیداتیو فعالیت‌های پرورشی مباحث جدید صنعت آبرزی پروری بوده که بایستی مورد توجه قرار گیرند. تلاش‌های بسیاری برای ارزیابی توانایی آنتی اکسیدان‌های مختلف از قبیل ویتامین E، ویتامین C، پیتیدها و پروتئین‌های هیدرولیز شده، مشتقات کیتوالیگوساکاریدها، آستاگزانتین، کاروتنوئیدها، پلی ساکاریدهای سولفات، فلوروتان‌ها، ترکیبات فنولی و فلاون‌ها صورت گرفته است. این ترکیبات قابلیت فراوانی جهت استفاده در تنظیم خوراک دام و آبزیان به عنوان

E به میزان ۲۵۰ میلی گرم در کیلوگرم استفاده شد، با این تفاوت که تیمار E فاقد پروتئین هیدرولیز ولی تیمار F دارای پروتئین هیدرولیز بود.

پس از تعیین ترکیب بیو شیمیایی مواد اولیه و تهیهی فرمولا سیون تیمارهای آزمایشی (جدول ۱)، مواد اولیهی مربوط به هر تیمار (بجز روغن و ویتامین E) بصورت کاملاً دقیق توزین و مخلوط شدند و تهیهی خوراکها با روش اکستروژن در خط تولید شرکت فیدارپاتیرا شهرکرد صورت پذیرفت. خوراکهای کلیه تیمارها دارای قطر  $(\pm 6/5)$  میلی متر، طول، میزان شناوری و بافت فیزیکی یکسانی بودند. به منظور تهیهی روغن اکسید شده به میزان کافی روغن تازه در یک ظرف ریخته شده و در شرایط نور دائمی، دمای آن با استفاده از المنت تا حدود ۶۰ درجه سانتی گراد بالا برده شد و درون آن با استفاده از دو عدد سنگ هوا، هوادهی ایجاد و میزان پراکسید آن هر ۸ ساعت یکبار با روش پیشنهادی Egan و همکاران (۱۹۹۷) اندازه گیری شد. بعد از حدود ۹۰ ساعت پراکسید روغن به عدد ۱۰۰ میلی اکی والان در کیلوگرم رسید که به منظور جلوگیری از پیشرفت فرآیند اکسیداسیون روغن مذکور به آن آنتی اکسیدان اتوکسی کوئین به میزان ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم اضافه گردید (Kubiriza et al., 2016).

ترکیب شیمیایی خوراکها بر اساس روشهای استاندارد (AOAC, 1993) اندازه گیری شد (جدول ۱). خوراکهای آماده شده به محل پرورش منتقل شد و تا اتمام زمان پرورش در دمای ۸-۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

## ۲.۲. تأمین، پرورش و غذادهی ماهیان

ماهیان مرحلهی پروراری سالم از مزرعه دشت آبی استان چهارمحال و بختیاری تهیه و به محل آزمایش منتقل شدند. مرحلهی پرورش ماهیان در پایلوت تحقیقاتی شرکت فرادانه صورت پذیرفت. ماهیان تهیه شده به مخازن گرد ۳۰۰ لیتری با خروجی مرکزی دارای جریان دائمی آب (اکسیژن بالای ۹ میلی گرم در لیتر،

افزودنیهای با خاصیت آنتی اکسیدانی جهت حفظ کیفیت خوراک و افزایش مدت زمان نگهداری و کاهش اثرات استرس اکسیداتیو گونهی هدف دارند (Barrow and Shahidi, 2008; Brewer, 2011; Al-Salif et al., 2014).

در تحقیق حاضر، تأثیر پروتئین هیدرولیز شده و آلفا-توکوفرول استات (ویتامین E) به عنوان آنتی اکسیدانهای طبیعی خوراکی و روغن اکسید شدهی ماهی بر سیستم آنتی اکسیدانی، رشد و کیفیت لاشهی ماهی قزل آلائی رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.

## ۲. مواد و روشها

### ۲.۱. آماده سازی جیره های غذایی

خوراکهای آزمایشی این طرح با همکاری واحد تحقیق و توسعهی شرکت فرادانه شهرکرد (تولید کنندهی تخصصی خوراک آبزیان) تهیه گردید. تمامی جیره های فرموله شده دارای مقادیر یکسان پروتئین (نیترژن)، چربی و انرژی بودند. تیمار A (FO50) به عنوان تیمار شاهد، فاقد پروتئین هیدرولیز بود و حاوی روغن تازه ماهی کیلکا (پراکسید یک میلی اکی والان بر کیلوگرم) و ۵۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم بود. در تیمار B (FO50HP) نیز از روغن تازه و ویتامین E به میزان ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم استفاده شد، اما در این تیمار پروتئین هیدرولیز شده (Actipal HP2) به میزان ۴ درصد جایگزین پودر ماهی جیره شده بود. تیمار C (OO50) نیز دارای ۵۰ میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم اما فاقد پروتئین هیدرولیز بوده و از روغن اکسید شدهی ماهی در این تیمار استفاده شده بود. در تیمار D (OO50HP) نیز همانند تیمار C از روغن اکسید شده و ویتامین E به میزان ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم استفاده شد، اما با این تفاوت که این تیمار نیز همانند تیمار B از پروتئین هیدرولیز شده به میزان ۴ درصد جیره استفاده گردید. تیمارهای E (OO250) و F (OO250HP) نیز حاوی روغن اکسید شده بودند اما در این تیمارها ویتامین

لیتر و دمای ۱۲ درجه سانتی گراد) منتقل شدند. ماهیان به مدت ۱۴ روز با شرایط جدید سازگار شدند.

آمونیاک کمتر از ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر، نیتريت کمتر از ۰/۱ میلی گرم در لیتر، نیترات کمتر از ۱ میلی گرم در

جدول ۱- فرمول و آنالیز خوراک‌های آزمایشی

مقدار مواد اولیه‌ی مورد استفاده در هر تیمار (درصد)						نام تیمار
F	E	D	C	B	A	
OO-250-HP	OO250	OO-50-HP	OO50	FO-50-HP	FO50	
۷	۱۰	۷	۱۰	۷	۱۰	پودر ماهی ساردین
۲	۴/۵	۲	۴/۵	۲	۴/۵	پودر ماهی کیلکا
۱۳	۱۱/۵	۱۳	۱۱/۵	۱۳	۱۱/۵	پودر ضایعات کنسرو تن ماهیان
۰	۴	۰	۴	۰	۴	پروتئین هیدرولیز (Actipal HP2) <sup>۱</sup>
۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	کنجاله سویا
۲۰/۲۰	۲۰/۲۰	۲۰/۲۴	۲۰/۲۴	۲۰/۲۴	۲۰/۲۴	آرد گندم
۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵	گلوتن گندم
۵/۵	۵/۵	۵/۵	۵/۵	۵/۵	۵/۵	گلوتن ذرت
۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	روغن ماهی تازه
۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	روغن ماهی اکسید شده
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	ویتامین E (۵۰٪) <sup>۲</sup>
۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	مکمل معدنی (فردانه)
۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	مکمل ویتامینه (فردانه) (بدون ویتامین E)
۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	نمک
۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	اسید آلی (ضد قارچ و کپک)
۶/۳۰	۶/۲۷	۶/۳۶	۶/۳۰۵۲	۶/۳۰	۶/۳۶	رطوبت
۱۴/۶۴	۱۴/۵۱	۱۴/۹۱	۱۴/۰۴	۱۴/۹۱	۱۴/۶۸	چربی
۸/۰۲	۸/۵۷	۷/۹۶	۸/۵۳	۷/۹۵	۸/۴۹	خاکستر
۴۱/۱۶	۴۱/۰۴	۴۱/۲۵	۴۱/۶۹	۴۱/۵۶	۴۱/۹۱	پروتئین

۱ حاصل از ضایعات عمل آوری ماهی تیلپیا، تهیه شده از شرکت‌های اقماری Dianagroup به نام Aquativ  
 ۲ آلفا-توکوفرول استات با غلظت ۵۰ درصد، تهیه شده از شرکت DSM سوئیس

کیفی و کمی آب ورودی به مخازن و تنظیم و یکسان کردن آن‌ها، جمع آوری و توزین تلفات احتمالی، تمیز کردن و فیلتراسیون فضولات و سایر مواد بصورت منظم صورت پذیرفت و کلیه‌ی اطلاعات روزانه شامل مقدار خوراک مصرفی، تعداد و وزن تلفات و پارامترهای کیفی آب (دما و اکسیژن) در فرم‌های مخصوص ثبت گردید.

پس از دوره‌ی سازگاری، ۴۳۲ قطعه ماهی با میانگین وزنی  $10 \pm 132$  گرم به وسیله‌ی عصاره‌ی گل میخک (۱۵۰ میلی گرم در لیتر) بی هوش شد و به صورت انفرادی توزین و به ۱۸ عدد مخزن پرورشی (هر تانک ۲۴ قطعه ماهی) منتقل شدند. ماهیان برای مدت هشت هفته روزانه در دو نوبت با جیره‌های مذکور با توجه به اشتها تغذیه شدند. بررسی‌های روزانه مانند بررسی وضعیت

### ۲.۳. زیست سنجی

عملیات وزن کشی ماهیان در طول دوره به صورت تجمعی هر دو هفته یکبار و پس از بی هوشی با اسانس گل میخک انجام شد. در انتهای آزمایش طول چنگالی و وزن ماهیان پس از بی هوشی بصورت انفرادی اندازه گیری شد و شاخص های مربوط به عملکرد ر شد شامل میزان میانگین وزن اولیه و نهایی، درصد بازماندگی، میانگین افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید (Chen et al., 2012).

$$100 \times \frac{\text{تعداد ماهی باقیمانده در انتهای آزمایش}}{\text{تعداد ماهی اول آزمایش}} = \text{درصد بازماندگی (SR)}$$

$$(WG) = \text{افزایش وزن (گرم)}$$

$$\text{میانگین وزن اولیه (گرم)} - \text{میانگین وزن نهایی (گرم)}$$

$$100 \times \frac{(\ln \text{وزن اولیه} - \ln \text{وزن نهایی})}{\text{کل روزهای پرورش}} = \text{نرخ رشد ویژه (SGR)}$$

$$\text{ضریب چاقی (CF)} = \frac{100 \times \text{وزن بدن (گرم)}}{(\text{طول کل بدن (سانتی متر)})^3}$$

$$\text{غذای مصرف شده (گرم)} = \frac{\text{غذای مصرف شده (گرم)}}{\text{افزایش وزن (گرم)}} = \text{ضریب تبدیل غذایی (FCR)}$$

پیستون دار انجام شد. خون بدست آمده به دو قسمت تقسیم شد که قسمت اول وارد لوله های هپارینه شد و در مجاورت یخ جهت اندازه گیری شاخص های خون شناسی به آزمایشگاه منتقل گردید و قسمت دیگر برای تهیه سرم به منظور اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی آسپارات آمینو ترانسفراز (AST) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) وارد میکروتیوب های غیر هپارینه شد و بلافاصله روی یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. سرم نمونه ها بعد از تشکیل لخته، با سانتریفیوژ کردن به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۵۰۰۰g جدا شد و در کرایوتیوب ریخته و داخل ایزت مایع تا زمان انجام آنالیز نگهداری شدند. شمارش گلبول های سفید (WBC) و قرمز (RBC) با استفاده از اسلاید نئوبار انجام شد (Rawling et al., 2009). تمایز سازی لوکوسیت ها نیز صورت گرفت (Klontz, 1994) و هماتوکریت (PCV) نیز با استفاده از لوله های میکرو هماتوکریت و دستگاه میکرو هماتوکریت تعیین گردید. تخمین غلظت هموگلوبین (Hb) به روش سیانو مت هموگلوبین (Collier, 1944) انجام گرفت. ماهی خون گیری شده برای آزمایش های بیشتر، کالبد شکافی شد و ابتدا کبد آن جدا و برای محاسبه شاخص کبدی (HSI) در ظرف تمیز و با استفاده ترازوی دقیق وزن گردید.

$$\text{شاخص کبدی (HSI)} = \frac{100 \times \text{وزن کبد (گرم)}}{\text{وزن کل بدن (گرم)}}$$

جهت محاسبه ی راندمان لاشه و شاخص احشایی، امعا و احشا ماهیان نمونه برداری شده برداشته شده و لاشه ماهی بطور کامل تمیز و با آب تازه و سرد شسته و وزن کشی شد. سپس از لاشه ی مورد نظر، فیله تهیه شده و فیله ها در کیسه های پلاستیکی تمیز و علامت گذاری شد و به همراه یخ جهت آزمایش های تجزیه شیمیایی لاشه، تیوباربیتریک اسید (TBARS) و اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب به فریزر ۲۰- درجه در آزمایشگاه شرکت فرادانه منتقل شدند.

### ۲.۴. نمونه برداری

به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف بر سیستم آنتی اکسیدانی و شاخص های سلامت ماهی، در پایان دوره یعنی پس از هفته ی هشتم پرورش، خون گیری و نمونه برداری از بافت کبد و فیله ی ماهیان صورت پذیرفت. قبل از نمونه برداری ابتدا به مدت یک روز غذاهای متوقف گردید و از هر مخزن (تکرار) دو عدد ماهی برای خون گیری و نمونه برداری بصورت تصادفی انتخاب شد و پس از بی هوشی با عصاره ی گل میخک و وزن کشی، عملیات خون گیری از محل ساقه دم با استفاده از سرنگ های

## ۲.۶. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

تمامی داده‌ها با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرف (ANOVA) ارزیابی شدند. وجود یا عدم وجود اختلاف معنی‌دار میان مقادیر میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزار SPSS 26 ویندوز با سطح معنی‌داری  $P < 0.05$  انجام شد.

## ۳. نتایج

شاخص‌های مربوط به عملکرد رشد ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی در جدول ۲ نشان داده شده است. میانگین وزن نهایی، WG، رشد روزانه، CF، SGR و درصد اضافه شده در تیمارهای A و B به طور معنی‌داری ( $P < 0.05$ ) بیش از دیگر تیمارها بود. پایین‌ترین مقدار FCR در تیمار B مشاهده شد ( $P < 0.05$ ) که اختلاف معنی‌داری با تیمار A نداشت ( $P > 0.05$ ) و بالاترین مقدار آن در تیمار E مشاهده شد ( $P < 0.05$ ) که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای C، D و F نشان نداد ( $P > 0.05$ ). HSI دارای بیشترین میزان در تیمار D و کمترین میزان در تیمار B بود ( $P < 0.05$ ). مقدار راندمان لاشه اختلاف معنی‌داری میان تیمارهای آزمایشی مختلف نشان نداد ( $P > 0.05$ ). در مورد مقدار VSI نیز فاقد اختلاف معنی‌دار میان تیمارهای مختلف بود ( $P > 0.05$ ).

همان‌گونه که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، بالاترین فعالیت ALT در تیمار C و پایین‌ترین آن در تیمارهای A و B مشاهده شد ( $P < 0.05$ ). به علاوه، بالاترین فعالیت AST در تیمارهای C و D و پایین‌ترین آن در تیمار B حاصل گردید ( $P < 0.05$ ). هرچند، میزان TBARS در تیمارهای مختلف فاقد اختلاف معنی‌داری بود ( $P > 0.05$ ). جدول ۴ مقادیر شاخص‌های خون‌شناسی شامل حجم کل توده‌ی خون (PCV)، گلبول‌های قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، گلبول‌های سفید (WBC)، نوتروفیل‌ها

$$\text{شاخص احشایی} = \frac{100 \times \text{وزن احشاء (گرم)}}{\text{وزن کل بدن (گرم)}} = \text{VSI}$$

## ۲.۵. اندازه‌گیری‌ها

اندازه‌گیری ترکیب شیمیایی مواد اولیه، خوراک‌های آزمایشی و فیله‌ی ماهیان (شامل رطوبت، چربی، پروتئین و خاکستر) بر اساس روش‌های استاندارد AOAC (AOAC, 1993) صورت پذیرفت.

برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های ALT و AST، سرم‌های تهیه شده که در نیتروژن مایع نگهداری شده بودند، به آزمایشگاه رویان پژوه شهرکرد منتقل شد و با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر و کیت‌های تجاری شرکت پارس آزمون سنجش شدند. به منظور حصول اطمینان از فرآیند سنجش از محلول کنترل و کالیبراتور TRULAB-N استفاده شد.

به منظور اندازه‌گیری شاخص TBARS مقدار ۱۰ گرم از نمونه فیله چرخ شده مورد استفاده قرار گرفت. سنجش این شاخص به صورت اسپکتروفتومتری طبق روش Pikul و همکاران (۱۹۸۹) انجام شد.

برای تعیین پروفایل اسیدهای چرب، ابتدا چربی فیله با استفاده از مخلوط کلروفرم: متانول (نسبت حجمی ۲:۱) استخراج گردید، با استفاده از هیدروکسید پتاسیم صابونی شد و توسط تری فلوراید بورون متانولی مطابق با روش‌های AOAC (AOAC, 2007) استریفیه گردید. پس از آن، جدا سازی و اندازه‌گیری مقادیر متیل استر اسیدهای چرب (FAMES) با استفاده از یک ستون باریک سیلیسی (طول ۳۰ متر، عرض ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت فیلم ۰/۲۰ میکرومتر) در یک کروماتوگراف گازی (Agilent 7890 N) مجهز به تزریق گر اسپلیت/اسپلیت لس و دتکتور یونیزاسیون شعله‌ای صورت گرفت. گاز نیتروژن با خلوص بالا به عنوان گاز حامل استفاده گردید. اسیدهای چرب با مقایسه‌ی زمان ابقای پیک FAME با استانداردهای سیگما تشخیص داده شد و به صورت درصد ناحیه‌ی مربوط به FAME‌ها بیان گردید.

D و پایین‌ترین آن در تیمار A مشاهده گردید ( $P < 0.05$ ).

جدول ۵ بیان‌گر مقادیر ماده‌ی خشک، رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر در فیله‌ی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تیمارهای D و E بیشترین میزان خاکستر و تیمار A کمترین میزان خاکستر را نشان دادند ( $P < 0.05$ ).

(Nut)، لنفوسیت‌ها (Lym)، مونوسیت‌ها (Mon)، ائوینوفیل‌ها (Eos)، بازوفیل‌ها (Baso)، در صد فاگو سیتوز و تعداد سلول‌های بنیادی را در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که از جدول بر می‌آید، بیشترین درصد نوتروفیل‌ها در تیمار E و کمترین آن در تیمار C قابل مشاهده است ( $P < 0.05$ ). هرچند، بالاترین درصد لنفوسیت‌ها در C و پایین‌ترین آن در تیمار E یافت شد ( $P < 0.05$ ). بالاترین درصد فاگوسیتوز نیز در تیمارهای C

جدول ۲- شاخص‌های رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی مختلف به مدت ۸ هفته\*

F	E	D	C	B	A	پارامتر مد نظر
۱۳۳/۵۷ ± ۱/۵۸	۱۳۳/۶۰ ± ۱/۲۷	۱۳۲/۷۱ ± ۱/۱۶	۱۳۳/۳۲ ± ۱/۲۲	۱۳۲/۸۳ ± ۱/۵۲	۱۳۱/۹۰ ± ۱/۷۱	میانگین وزن اولیه (گرم)
۲۳۱/۵۵ ± ۳/۱۲a	۲۲۲/۴۴ ± ۱۱/۸۰a	۲۳۳/۵۵ ± ۱۰/۳۸a	۲۲۸/۴۸ ± ۷/۶۸a	۲۷۹/۳۷ ± ۴/۷۲b	۲۷۰/۷۳ ± ۱۴/۷۹b	میانگین وزن نهایی (گرم)
۹۷/۹۸ ± ۲/۷۴a	۸۸/۸۴ ± ۱۱/۲۰a	۱۰۰/۸۴ ± ۱۰/۵۴a	۹۵/۱۶ ± ۷/۶۱a	۱۴۶/۵۳ ± ۳/۶۴b	۱۳۸/۸۳ ± ۱۵/۵۴b	میانگین وزن اضافه شده WG (گرم)
۱/۲۳ ± ۰/۰۵ bc	۱/۳۲ ± ۰/۱۳ c	۱/۲۶ ± ۰/۰۸ bc	۱/۲۴ ± ۰/۰۶ bc	۱/۰۳ ± ۰/۰۳a	۱/۱۰ ± ۰/۱۳ab	ضریب تبدیل غذایی FCR
۵/۵۵ ± ۴/۸۱	۹/۷۲ ± ۲/۴۱	۱۱/۱۱ ± ۹/۶۲	۴/۱۷ ± ۴/۱۷	۶/۹۵ ± ۴/۸۱	۸/۳۳ ± ۴/۱۷	درصد تلفات
۱/۷۵ ± ۰/۰۵a	۱/۵۸ ± ۰/۲۰a	۱/۸۰ ± ۰/۱۹a	۱/۷۰ ± ۰/۱۴a	۲/۶۲ ± ۰/۰۶b	۲/۴۸ ± ۰/۲۸b	رشد روزانه (گرم)
۱/۱۷ ± ۰/۰۲a	۱/۱۸ ± ۰/۰۵a	۱/۲۲ ± ۰/۰۷a	۱/۱۹ ± ۰/۰۳a	۱/۳۴ ± ۰/۰۱b	۱/۳۲ ± ۰/۰۴b	ضریب چاقی CF
۱/۰۲ ± ۰/۰۳a	۰/۹۴ ± ۰/۰۹a	۱/۰۵ ± ۰/۰۹a	۱/۰۰ ± ۰/۰۷a	۱/۳۸ ± ۰/۰۲b	۱/۳۳ ± ۰/۱۱b	نرخ رشد ویژه SGR (درصد در روز)
۷۳/۳۶ ± ۲/۲۵a	۶۶/۴۸ ± ۸/۱۸a	۷۶/۰۰ ± ۸/۱۴a	۷۱/۳۸ ± ۵/۷۴a	۱۱۰/۳۱ ± ۲/۱۸b	۱۰۵/۳۱ ± ۱۲/۵۸b	درصد وزن اضافه شده
۲/۰۹ ± ۰/۳۸ab	۲/۲۸ ± ۰/۲۵ab	۲/۳۹ ± ۰/۲۳b	۲/۲۶ ± ۰/۳۷ab	۱/۹۱ ± ۰/۲۹a	۲/۰۷ ± ۰/۵۱ab	شاخص کبدی (HSI)
۸۶/۱۸ ± ۱/۷۸	۸۵/۶۳ ± ۱/۵۹	۸۴/۶۴ ± ۱/۹۷	۸۴/۸۵ ± ۲/۱۱	۸۶/۲۵ ± ۲/۲۲	۸۵/۷۵ ± ۱/۷۵	راندمان لاشه
۱۳/۸۲ ± ۱/۷۸	۱۴/۳۷ ± ۱/۵۹	۱۵/۳۶ ± ۱/۹۷	۱۵/۱۵ ± ۲/۱۱	۱۳/۷۵ ± ۲/۲۲	۱۴/۲۵ ± ۱/۷۵	شاخص احشایی (VSI)

\*اعداد (میانگین ± انحراف معیار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح  $P < 0.05$  هستند.

جدول ۳- فعالیت آنزیم‌های کبدی در خون و میزان TBARS در عضله ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی مختلف به مدت ۸ هفته\*

F	E	D	C	B	A	نام آنزیم
۸ ± ۱۰ab	۷/۶۶ ± ۴/۱ab	۹/۶۶ ± ۵/۵ab	۱۶/۰۰ ± ۹/۱۶b	۲/۳۳ ± ۲/۳a	۲/۶۶ ± ۲/۰۸a	ALT (IU/dL)
۵۴۲ ± ۲۱۷/۸۷ab	۵۷۵ ± ۱۸۳/۷۵ab	۸۴۰ ± ۳۰۱b	۸۳۷/۵ ± ۱۹۸/۳۸b	۴۹۵ ± ۹۴/۶۹a	۵۷۸ ± ۱۳۵/۱۶ab	AST (IU/dL)
۱/۷۱ ± ۰/۶۸	۱/۳۲ ± ۰/۵۶	۰/۹۲ ± ۰/۲۰	۱/۱۱ ± ۰/۱۸	۲/۰۳ ± ۱/۳۹	۱/۳۱ ± ۰/۲۱	(TBARS) (mg/Kg)

\*اعداد (میانگین ± انحراف معیار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح  $P < 0.05$  هستند.



جدول ۴- شاخص های خون شناسی در ماهیان قزل آلائی رنگین کمان تغذیه شده با جیره های غذایی مختلف به مدت ۸ هفته\*

F	E	D	C	B	A	شاخص
۴۵/۱۷ ± ۸/۹۳	۴۶/۱۷ ± ۱۱/۵۱	۴۷/۶۷ ± ۴/۹۷	۴۰/۰۰ ± ۲/۶۱	۴۱/۰۰ ± ۴/۳۸	۴۸/۶۷ ± ۷/۸۷	حجم کل توده‌ی خون PCV (درصد)
۳/۹۷ ± ۰/۹۸	۴/۱۵ ± ۱/۳۲	۴/۲۷ ± ۰/۵۶	۳/۴۲ ± ۰/۲۳	۳/۵۳ ± ۰/۵۳	۴/۲۰ ± ۰/۷۰	گلبول‌های قرمز RBC (۱۰ <sup>۶</sup> × میلی متر مکعب)
۱۵/۰۸ ± ۳/۰۰	۱۵/۴۳ ± ۳/۸۹	۱۵/۸۸ ± ۱/۶۶	۱۳/۳۳ ± ۰/۸۵	۱۳/۷۰ ± ۱/۴۸	۱۵/۷۰ ± ۲/۰۹	هموگلوبین Hb (گرم در ۱۰ میلی لیتر)
۱۹۱۵/۰۰ ± ۳۱۹۹/۰۶	۲۱۸۹۱/۶۷ ± ۷۲۱۰/۹۲	۱۹۰۰۸/۳۳ ± ۴۲۱۲/۰۶	۱۹۷۴۱/۶۷ ± ۲۰۳۷/۰۱	۲۰۵۰۸/۳۳ ± ۴۸۰۳/۳۸	۱۷۰۶۶/۶۷ ± ۴۵۴۰/۸۹	گلبول‌های سفید WBC (تعداد در میکرو لیتر)
۱۶/۶۷ ± ۱/۰۴ ab	۱۸/۰۰ ± ۰/۰۱ b	۱۷/۸۳ ± ۰/۰۳ ab	۱۵/۸۳ ± ۱/۰۶ a	۱۶/۶۷ ± ۱/۰۰ ab	۱۷/۸۳ ± ۰/۰۵ ab	نوتروفیل‌ها Nut (درصد از کل لوکوسیت‌ها)
۸۷/۲۷ ± ۲/۵۵ ab	۸۰/۰۰ ± ۰/۰۱ a	۸۱/۳۳ ± ۵/۵۷ ab	۸۸/۸۳ ± ۱/۹۹ b	۸۵/۳۳ ± ۵/۵۴ ab	۸۱/۶۷ ± ۶/۸۶ ab	لنفوسیت‌ها Lym (درصد از کل لوکوسیت‌ها)
۰/۵۱ ± ۰/۰۲	۰/۵۳ ± ۰/۰۱	۰/۵۱ ± ۰/۰۳	۰/۵۲ ± ۰/۰۵	۰/۵۴ ± ۰/۰۴	۰/۵۰ ± ۰/۰۷	مونوسیت‌ها Mon (درصد از کل لوکوسیت‌ها)
۰/۲۷ ± ۰/۱۰	۰/۲۷ ± ۰/۰۸	۰/۳۳ ± ۰/۰۷	۰/۳۱ ± ۰/۰۲	۰/۲۵ ± ۰/۰۵	۰/۲۹ ± ۰/۰۷	ائوزینوفیل‌ها Eos (درصد از کل لوکوسیت‌ها)
۰/۰۶ ± ۰/۰۲	۰/۰۹ ± ۰/۰۱	۰/۰۹ ± ۰/۰۲	۰/۱۰ ± ۰/۰۱	۰/۰۶ ± ۰/۰۱	۰/۰۸ ± ۰/۰۲	بازوفیل‌ها Baso (درصد از کل لوکوسیت‌ها)
۱۵/۸۳ ± ۵/۴۶ ab	۱۱/۸۳ ± ۳/۱۹ ab	۱۷/۱۷ ± ۴/۴۹ b	۱۶/۳۳ ± ۴/۷۲ b	۱۳/۵۰ ± ۲/۵۹ ab	۱۰/۵۰ ± ۴/۱۴ a	فاگوسیتوز (درصد)

\*اعداد (میانگین ± انحراف معیار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح  $P < 0.05$  هستند.

جدول ۵- ترکیب شیمیایی (درصد در وزن خشک) در فیله‌ی ماهیان قزل آلائی رنگین کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی مختلف به مدت ۸ هفته\*

F	E	D	C	B	A	پارامتر
۲۵/۶۳ ± ۰/۳۳	۲۶/۱۴ ± ۲/۲۰	۲۵/۴۸ ± ۱/۲۱	۲۵/۵۱ ± ۰/۷۳	۲۶/۴۴ ± ۰/۸۱	۲۷/۵۶ ± ۱/۹۸	ماده‌ی خشک
۷۴/۳۷ ± ۰/۳۳	۷۳/۸۶ ± ۲/۲۰	۷۴/۵۲ ± ۱/۲۱	۷۴/۴۹ ± ۰/۷۳	۷۳/۵۶ ± ۰/۸۱	۷۲/۴۴ ± ۱/۹۸	رطوبت
۶۸/۱۵ ± ۵/۳۳	۶۵/۶۸ ± ۳/۱۶	۶۷/۹۳ ± ۳/۳۶	۷۱/۰۸ ± ۱/۴۷	۶۸/۶۰ ± ۲/۹۶	۶۵/۶۰ ± ۴/۳۸	پروتئین
۲۷/۵۳ ± ۵/۰۵	۲۳/۴۰ ± ۲/۴۹	۲۲/۷۲ ± ۲/۴۱	۲۱/۶۷ ± ۱/۳۸	۲۵/۳۱ ± ۱/۸۸	۲۶/۴۶ ± ۴/۹۰	چربی
۶/۶۵ ± ۰/۴۵ ab	۷/۲۲ ± ۱/۸۶ b	۷/۰۵ ± ۰/۸۵ b	۵/۹۸ ± ۰/۱۸ ab	۶/۲۱ ± ۰/۵۹ ab	۵/۱۸ ± ۰/۲۱ a	خاکستر

\*اعداد (میانگین ± انحراف معیار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح  $P < 0.05$  هستند.

میزان ۱۸:۰ (اسید استئاریک) در تیمار A و پایین ترین میزان آن در تیمار D مشاهده شد ( $P > 0.05$ ). بیشترین مقدار ۴n=۶: ۲۰ (اسید آراشیدونیک) نیز در تیمار D و کمترین مقدار آن در تیمار F مشاهده گردید ( $P < 0.05$ ).

جدول ۶ ترکیب اسیدهای چرب فیله‌ی ماهیان قزل آلائی رنگین کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی مختلف را نشان می‌دهد. طبق جدول، تیمار F بیشترین مقدار ۱n=۹: ۱۴ (۵- سیس- اسید تترادسنوئیک) و تیمار B کمترین مقدار آن را نشان داد ( $P < 0.05$ ). بالاترین

جدول ۶- ترکیب اسیدهای چرب (درصد از کل اسیدهای چرب) در فیله‌ی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی مختلف به مدت ۸ هفته\*

F	E	D	C	B	A	اسید چرب
۲/۱۶ ± ۰/۰۵	۲/۰۸ ± ۰/۲۰	۲/۱۱ ± ۰/۱۹	۲/۰۲ ± ۰/۱۴	۱/۸۶ ± ۰/۲۴	۲/۰۷ ± ۰/۰۶	۱۴:۰
۰/۳۲ ± ۰/۰۱ b	۰/۳۰ ± ۰/۰۲ ab	۰/۳۱ ± ۰/۰۴ ab	۰/۳۰ ± ۰/۰۴ ab	۰/۲۶ ± ۰/۰۳ a	۰/۳۰ ± ۰/۰۲ ab	۱۴: ۱n-۹
۱۹/۶۱ ± ۰/۳۵	۱۹/۴۱ ± ۰/۹۲	۱۸/۹۵ ± ۰/۷۷	۱۸/۹۶ ± ۰/۲۷	۱۷/۷۱ ± ۱/۹۸	۱۹/۱۰ ± ۰/۷۶	۱۶:۰
۵/۶۲ ± ۰/۴۲	۵/۹۵ ± ۰/۶۸	۵/۹۳ ± ۰/۱۵	۵/۶۴ ± ۰/۵۱	۵/۰۶ ± ۱/۳۰	۵/۶۴ ± ۰/۵۶	۱۶: ۱n-۷
۵/۰۰ ± ۰/۱۵ ab	۵/۱۱ ± ۰/۳۷ ab	۴/۷۸ ± ۰/۳۲ a	۴/۹۴ ± ۰/۰۱ ab	۵/۰۰ ± ۰/۲۳ ab	۵/۳۲ ± ۰/۱۶ b	۱۸:۰
۳۵/۱۹ ± ۰/۹۴	۳۵/۸۲ ± ۱/۶۴	۳۴/۷۵ ± ۱/۱۲	۳۶/۱۲ ± ۱/۹۲	۳۴/۹۴ ± ۰/۴۴	۳۵/۱۵ ± ۰/۷۲	۱۸: ۱n-۹
۲/۶۷ ± ۰/۲۸	۲/۵۹ ± ۰/۱۱	۲/۵۶ ± ۰/۰۶	۲/۵۶ ± ۰/۰۵	۲/۴۵ ± ۰/۱۷	۲/۵۱ ± ۰/۱۲	۱۸: ۱n-۱۱
۱۸/۱۰ ± ۰/۱۹	۱۶/۱۷ ± ۱/۷۳	۱۵/۳۷ ± ۱/۱۳	۱۶/۰۲ ± ۲/۱۳	۱۹/۴۹ ± ۵/۲۴	۱۶/۵۸ ± ۳/۰۸	۱۸: ۲n-۶
۰/۸۸ ± ۰/۳۱	۰/۶۶ ± ۰/۱۸	۰/۵۶ ± ۰/۰۹	۰/۶۶ ± ۰/۲۲	۰/۸۱ ± ۰/۲۳	۰/۶۴ ± ۰/۱۲	۲۰:۰
۲/۸۹ ± ۰/۰۹	۲/۵۸ ± ۰/۳۱	۲/۸۸ ± ۰/۴۹	۲/۷۵ ± ۰/۲۰	۳/۳۲ ± ۰/۷۷	۳/۰۹ ± ۰/۶۱	۱۸: ۳n-۶
۰/۸۸ ± ۰/۲۲	۰/۷۹ ± ۰/۰۴	۰/۸۹ ± ۰/۱۱	۰/۸۴ ± ۰/۰۹	۱/۱۷ ± ۰/۵۱	۰/۹۱ ± ۰/۱۲	۲۰: ۱n-۱۱
۰/۸۴ ± ۰/۱۲	۰/۷۵ ± ۰/۰۸	۰/۷۵ ± ۰/۰۸	۰/۷۶ ± ۰/۱۰	۰/۸۴ ± ۰/۰۵	۰/۷۹ ± ۰/۰۷	۱۸: ۳n-۳
۰/۷۸ ± ۰/۱۶	۰/۶۵ ± ۰/۰۴	۰/۷۳ ± ۰/۰۸	۰/۶۸ ± ۰/۰۵	۰/۸۱ ± ۰/۱۶	۰/۷۵ ± ۰/۰۸	۲۱:۰
۰/۶۳ ± ۰/۰۶	۰/۵۸ ± ۰/۰۴	۰/۵۶ ± ۰/۰۳	۰/۵۵ ± ۰/۱۲	۰/۷۱ ± ۰/۲۰	۰/۶۴ ± ۰/۱۲	۲۰: ۲n-۶
۰/۷۳ ± ۰/۲۱	۰/۷۱ ± ۰/۰۴	۰/۷۷ ± ۰/۰۵	۰/۷۳ ± ۰/۰۱	۰/۷۳ ± ۰/۱۱	۰/۶۹ ± ۰/۰۴	۲۲: ۱n-۹
۰/۲۱ ± ۰/۰۴ a	۰/۲۸ ± ۰/۱۱ ab	۰/۴۲ ± ۰/۱۱ b	۰/۲۸ ± ۰/۱۰ ab	۰/۳۰ ± ۰/۱۲ ab	۰/۲۸ ± ۰/۱۰ ab	۲۰: ۴n-۶
۰/۴۸ ± ۰/۱۱	۰/۵۵ ± ۰/۰۲	۱/۲۳ ± ۰/۶۳	۰/۹۶ ± ۰/۵۹	۰/۴۹ ± ۰/۰۱	۰/۹۰ ± ۰/۶۶	۲۰: ۵n-۳
۰/۲۲ ± ۰/۰۷	۰/۲۳ ± ۰/۰۷	۰/۳۲ ± ۰/۰۴	۰/۳۰ ± ۰/۰۶	۰/۲۲ ± ۰/۰۳	۰/۲۷ ± ۰/۰۵	۲۴: ۱n-۹
۲/۶۸ ± ۰/۴۰	۴/۲۹ ± ۲/۸۷	۵/۹۵ ± ۲/۰۸	۳/۳۰ ± ۰/۰۵	۳/۶۴ ± ۲/۰۹	۴/۳۳ ± ۲/۳۱	۲۲: ۶n-۳
۲۸/۴۴ ± ۰/۲۲	۲۷/۹۱ ± ۱/۴۵	۲۷/۱۲ ± ۱/۲۰	۲۷/۳۶ ± ۰/۲۱	۲۶/۱۹ ± ۱/۹۴	۲۷/۸۸ ± ۰/۷۷	SFA
۴۵/۶۳ ± ۰/۹۱	۴۶/۳۸ ± ۲/۳۰	۴۵/۵۲ ± ۱/۲۷	۴۶/۴۹ ± ۲/۰۳	۴۴/۸۳ ± ۱/۲۷	۴۵/۴۶ ± ۱/۱۷	MUFA
۳۶/۴۷ ± ۰/۷۵	۳۷/۰۵ ± ۱/۵۶	۳۶/۱۴ ± ۱/۰۵	۳۷/۴۵ ± ۱/۸۴	۳۶/۱۵ ± ۰/۳۶	۳۶/۴۰ ± ۰/۷۳	n-۹ MUFA
۲۵/۸۲ ± ۰/۷۰	۲۵/۲۱ ± ۳/۱۶	۲۷/۱۷ ± ۱/۸۴	۲۴/۶۲ ± ۲/۰۹	۲۸/۷۸ ± ۴/۰۸	۲۶/۶۱ ± ۱/۸۱	PUFA
۴/۰۰ ± ۰/۴۸	۵/۵۹ ± ۲/۹۴	۷/۹۳ ± ۲/۷۹	۵/۰۲ ± ۰/۶۲	۴/۹۷ ± ۲/۰۸	۶/۰۱ ± ۲/۹۷	n-۳ PUFA
۲۱/۸۲ ± ۰/۳۱	۱۹/۶۲ ± ۱/۴۸	۱۹/۲۳ ± ۱/۶۱	۱۹/۶۰ ± ۲/۳۲	۲۳/۸۱ ± ۶/۰۷	۲۰/۶۰ ± ۳/۶۹	n-۶ PUFA
۰/۱۸ ± ۰/۰۲	۰/۲۹ ± ۰/۱۵	۰/۴۲ ± ۰/۱۸	۰/۲۶ ± ۰/۰۶	۰/۲۴ ± ۰/۱۷	۰/۳۱ ± ۰/۲۱	n-۳/ n-۶
۴/۰۰ ± ۰/۴۷	۵/۶۰ ± ۲/۹۱	۸/۱۶ ± ۲/۷۷	۵/۰۹ ± ۰/۶۱	۵/۱۴ ± ۲/۰۳	۶/۱۵ ± ۲/۹۵	LC PUFA
۳/۱۶ ± ۰/۴۷	۴/۸۴ ± ۲/۸۷	۷/۱۸ ± ۲/۷۱	۴/۲۶ ± ۰/۶۰	۴/۱۳ ± ۲/۰۹	۵/۲۳ ± ۲/۹۷	n-۳ LC PUFA
۲۱/۸۶ ± ۳/۳۳	۲۱/۶۲ ± ۳/۲۷	۲۰/۶۶ ± ۳/۵۹	۲۱/۱۹ ± ۲/۶۹	۲۳/۰۶ ± ۵/۷۸	۲۱/۲۸ ± ۵/۱۹	۱۸: ۲n-۶/ ۱۸: ۳n-۳
۱۵/۵۴ ± ۳/۳۵	۱۷/۴۲ ± ۶/۵۱	۱۷/۰۱ ± ۴/۱۵	۱۶/۳۲ ± ۴/۳۲	۱۳/۵۶ ± ۱/۷۸	۱۷/۶۱ ± ۳/۶۲	(۲۰: ۵n-۳ + ۲۲: ۶n-۳) ۲۰: ۴n-۶
۰/۹۱ ± ۰/۰۲	۰/۹۱ ± ۰/۱۶	۱/۰۰ ± ۰/۱۱	۰/۹۰ ± ۰/۰۸	۱/۱۱ ± ۰/۲۳	۰/۹۶ ± ۰/۰۹	PUFA/ SFA

\*اعداد (میانگین ± انحراف معیار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار در سطح  $P < 0.05$  هستند.

#### ۴. بحث و نتیجه گیری

از آن جا که عملکرد رشد در ماهیان قزل آلاهی رنگین کمان تغذیه شده با خوراک های حامل روغن ماهی تازه یعنی تیمارهای A و B بهتر از ماهیان تغذیه شده با خوراک های حامل روغن اکسید شده بود، به نظر می رسد که نتایج مربوط به پارامترهای رشد تأیید کنندهی نتایج تحقیقات دیگر است. در ماهیان، عدم تعادل بین عوامل اکسید کننده و آنتی اکسیدان ها موجب کاهش رشد و بقا می گردد (Sargent *et al.*, 2002). Dong و همکاران (۲۰۰۸) نیز کاهش رشد با افزایش اکسیداسیون چربی خوراک را در ماهی کپور نقره ای (*Hypophthalmichthys molitrix*) گزارش نموده اند. هرچند، اختلاف معنی داری از نظر میزان تلفات میان تیمارها مشاهده نشد که این موضوع می تواند بیان گر عملکرد مناسب ویتامین E و پروتئین هیدرولیز شدهی موجود در خوراک به عنوان عوامل آنتی اکسیدان در جلوگیری از اثرات روغن اکسید شدهی خوراک بر میزان تلفات ماهیان باشد. گفته شده که گنجاندن ویتامین E در مقادیر بیشتر از حد مطلوب در خوراک، به خصوص در غیاب آنتی اکسیدان ها، می تواند برای سلامتی ماهی مضر باشد (Gatta *et al.*, 2000; Tocher *et al.*, 2002; Hamre, 2011; Lozano *et al.*, 2017). این موضوع می تواند دلیل بالاتر بودن میزان FCR در ماهیان تغذیه شده با خوراک E باشد. حداقل مقدار مورد نیاز ویتامین E برای ماهی قزل آلاهی رنگین کمان برابر با ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم خوراک تخمین زده شده است (Cowey *et al.*, 1983).

درجهی حفاظت از سلول های کبدی به وسیلهی میزان فعالیت آنزیم های ALT و AST سنجیده می شود (Cui *et al.*, 2014)، به طوری که میزان فعالیت بالاتر این آنزیم ها بیان گر تضعیف یا نابود سازی عملکرد کبد است (Pan *et al.*, 2003). از آن جا که در مطالعهی حاضر میزان فعالیت بیشتر این آنزیم ها در تیمارهای تغذیه شده با روغن ماهی اکسید شده با مقدار کمتر ویتامین E و به ویژه در تیمار تغذیه شده با خوراک دارای روغن ماهی

اکسید شده و مقدار کمتر ویتامین E بدون پروتئین هیدرولیز شده مشاهده گردید، می توان چنین نتیجه گیری نمود که ویتامین E و پروتئین هیدرولیز شده در خوراک عملکرد مطلوبی جهت حفاظت از سلول های کبدی در برابر آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو در نتیجهی تغذیه از خوراک های حامل روغن اکسید شده نشان داده اند.

اسید تیوباربتوریک (TBA) بیان گر مقدار محصولات ثانویهی اکسیداسیون است. مقدار TBA به ویژه غلظت مالون آلدئید (MDA) را تعیین می کند که یک محصول ثانویهی ناشی از واکنش های فرآیند اکسیداسیون بوده و نیز یک آلدئید واکنش گر است. از آن جا که عدد TBARS در تمامی تیمارها پایین تر از ۲ میکرو مول MDA-اکی والان در هر گرم چربی به دست آمد (Connel, 1975)، این موضوع می تواند بیان کنندهی عملکرد مناسب ویتامین E به تنهایی یا همراه با پروتئین هیدرولیز شده به عنوان عوامل آنتی اکسیدان در جلوگیری از ایجاد طعم نا مطلوب فیلهی ماهی قزل آلاهی رنگین کمان حتی در صورت تغذیه با خوراک حاوی روغن اکسید شده باشد.

در مورد شاخص های خونی نیز درصدهای نوتروفیل Nut و لنفوسیت Lym رابطهی معکوسی را با یکدیگر نشان دادند، به طوری که Nut در تیمار C کمترین و در تیمار E بیشترین درصد را داشت و بر عکس، Lym در تیمار C بیشترین و در تیمار E کمترین درصد را نشان داد. این موضوع می تواند مربوط به تداخل ایجاد شده در سیستم ایمنی در نتیجهی واکنش میان ماکروفاژها و نوتروفیل ها با ویتامین E و روغن اکسید شده مورد استفاده در تهیهی خوراک باشد (Aftabgard *et al.*, 2019). این موضوع در حالیهست که به نظر می رسد ویتامین E با کمک پروتئین هیدرولیز شدهی مورد استفاده در خوراک در صدهای این سلول های خونی را تعدیل نموده به طوری که تفاوت معنی داری از نظر در صدهای آن ها در ماهیان تغذیه شده با خوراک های حامل روغن اکسید شده به همراه ترکیب ویتامین E و پروتئین هیدرولیز شده و ماهیان تغذیه شده

باشد.

اسیدهای چرب اشباع غالب در ماهیچه شامل ۱۶:۰ (اسید پالمیتیک) و ۱۸:۰ و اسیدهای چرب غیر اشباع عمده شامل ۱۶: ۱n-۷ (اسید پالمیتولئیک)، ۱۸: ۱n-۹ (اسید اولئیک)، ۱۸: ۲n-۶ (اسید لینولئیک) و ۲۲: ۶n-۳ (اسید دوکوساهگزانوئیک) بودند. در تحقیق دیگری (Akhtar *et al.*, 1999) ماه بیان قزل‌آلای رنگین‌کمان ۲۰۰ گرمی به مدت ۲۸ هفته با استفاده از خوراک‌های حامل ۵۰۰ میلی گرم آلفا-توکوفرل استات و ۱۵ میلی گرم کانتاگزانتین در کیلوگرم، ۵۰۰ میلی گرم آلفا-توکوفرل استات و ۱۷۵ میلی گرم اولئورزین پاپریکا در کیلوگرم یا ۵۰۰ میلی گرم آلفا-توکوفرل استات همراه با ۳۵۰ میلی گرم اولئورزین پاپریکا در کیلوگرم غذادهی شدند. یک خوراک تجاری نیز به عنوان خوراک شاهد در نظر گرفته شد. هیچ گونه تأثیر خوراک بر ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه گزارش نشد. گزارش‌های دیگر (Boggio *et al.*, 1985; Frigg *et al.*, 1990; Waagbø *et al.*, 1991; Sigurgisladottir *et al.*, 1994) نیز حاکی از عدم تأثیر حضور یا فقدان آلفا-توکوفرل در مقادیر مختلف در خوراک بر ترکیب اسیدهای چرب آزاد ماهیان است. Watanabe و همکاران (۱۹۸۱) نیز اختلاف فاحشی از نظر توزیع اسیدهای چرب در کبد یا ماهیچه‌ی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های حامل مقادیر مختلف آلفا-توکوفرل مشاهده نمودند. Boggio و همکاران (۱۹۸۵) گزارش نموده‌اند که ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه و به خصوص انواع ۳-n و ۶-n تحت تأثیر چربی خوراک قرار می‌گیرند.

اسید چرب ۱۸:۰ قابلیت هضم و جذب پایین در پستانداران دارد (Kritchevsky, 1994). بنابراین، پایین‌تر بودن میزان آن در فیله‌ی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک D می‌تواند به عنوان یک مزیت برای انسان به عنوان مصرف‌کننده‌ی ماهی به حساب آید. هرچند، اختلاف معنی‌داری با دیگر تیمارها به جز تیمار A نداشت. بالاترین میزان ۶-n: ۴n: ۲۰: نیز در ماهیان تغذیه شده با خوراک D مشاهده شد. به طور کلی، اسیدهای

با خوراک‌های حامل روغن تازه مشاهده نشد. در تحقیق دیگری (Rahimi *et al.*, 2015) ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با خوراک‌های حامل ویتامین E در مقادیر ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم تغذیه شدند. افزایش درصد لنفوسیت‌ها در صورت تغذیه‌ی ماهی با خوراک‌های حامل ۲۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم و کاهش درصد نوتروفیل‌ها در صورت تغذیه‌ی ماهی با خوراک حامل ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شد. این محققان بروز چنین تغییراتی را در تعداد سلول‌های خونی علاوه بر گونه‌ی ماهی به شرایط محیطی نسبت دادند.

سلول‌های عمده‌ی فاگوسیتوز کننده در ماهیان شامل نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها هستند. این سلول‌ها عمدتاً از طریق تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) در حین تنفس مداوم سبب از بین رفتن باکتری‌ها می‌شوند. علاوه بر آن، نوتروفیل‌ها دارای میلو پراکسیداز در دانه‌های سیتوپلاسمی خود بوده که در حضور هالید و هیدروژن پر اکسیداز با استفاده از هالوژنه کردن دیواره‌ی سلولی باکتری‌ها آن‌ها را از بین می‌برند. این سلول‌ها همچنین حامل لیزوزیم‌ها و دیگر آنزیم‌های هیدرولیتیک در لیزوزوم‌های خود می‌باشند (Uribe *et al.*, 2011). ماکروفاژها نیز قادر به تولید اکسید نیتریک در پستانداران بوده و می‌توانند به صورت بالقوه به عنوان عوامل ضد باکتری، پراکسی نیترات‌ها و گروه‌های هیدروکسیل عمل نمایند (Secombes, 1996). در تحقیق حاضر، درصد فاگو سیتوز در تیمارهای C و D بالاتر از دیگر تیمارها بود که این موضوع می‌تواند به سیستم ایمنی ماهیان جهت آمادگی برای مقابله با عوامل عفونت‌زا کمک کند.

ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی مختلف دارای ترکیب شیمیایی مشابه بودند که نشان دهنده‌ی عدم تأثیر سوء روغن اکسید شده‌ی موجود در خوراک بر ترکیب شیمیایی لاشه‌اند. این موضوع می‌تواند نمایان‌گر عملکرد مطلوب آنتی‌اکسیدان‌های اضافه شده به خوراک جهت جلوگیری از ایجاد آثار منفی روغن اکسید شده‌ی خوراک بر ترکیب شیمیایی لاشه

گرم پر اکسید بر کیلو گرم چربی تعیین شده است که این عدد در مورد روغن ماهی تازه و اکسید شده مورد استفاده در این تحقیق به ترتیب برابر با ۱ و ۱۰۰ میلی اکی والان گرم پر اکسید بر کیلوگرم بود.

با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر مبنی بر داده‌های مربوط به عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی، TBARS، خون‌شناسی و اسیدهای چرب به نظر می‌رسد که حضور ویتامین E به میزان ۵۰ میلی گرم همراه با پروتئین هیدرولیز شده با جایگزینی ۴ درصد جای پودر ماهی در خوراک ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پروراری به نحو مطلوبی قادر به جلوگیری از آسیب‌های استرس اکسیداتیو در ماهی است.

## ۵. تقدیر و تشکر

بدین ترتیب از شرکت فرادانه (بزرگترین تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان خاورمیانه) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای حمایت از انجام طرح تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

چرب PUFA با ۲۰ اتم کربن در زنجیره‌ی خود نقش مهمی در تولید ایکوزانوئیدها دارند. ایکوزانوئیدها ترکیبات خطی یا حلقه‌ای با فعالیت‌های بسیار حیاتی زیستی هستند (Sargent *et al.*, 2002; Tapiero *et al.*, 2002). بنابراین، تهیه‌ی خوراکی که بتواند از اکسیداسیون این گونه اسیدهای چرب جلوگیری نماید، برای ماهی امری حیاتی است. البته به دلیل تأثیر آنتاگونیستی ۶-۴n: ۲۰ بر فواید اسیدهای چرب PUFA ۳-n در سلامتی قلبی-عروقی انسان (Tapiero *et al.*, 2002) مقادیر پایین این اسید چرب در ماهیان به نفع انسان به عنوان مصرف کننده محسوب می‌شود. در این مورد می‌توان برای خوراک F ارجحیت قایل شد. لازم به ذکر است که ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های آزمایشی مختلف در تحقیق حاضر حامل نسبت‌های ۶-n/ ۳-n-۳/ بیش از ۰/۲-۰/۱ در ماهیچه‌های خود بودند که این نسبت توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است (Tanamati *et al.*, 2009). بر اساس استاندارد ملی خوراک آبزیان پرورشی (استاندارد ۵۶۶۱) حد مجاز و قابل قبول پیشنهادی عدد پر اکسید نیز ۱۰ میلی اکی والان

## ۶. منابع

## References

- Aftabgard, M., Salarzadeh, A., Mohsen, M., Bahri-ShabaniPour, A.H., Zorriehzahra, M.E.J., 2019. The combined efficiency of dietary isomaltooligosaccharides and *Bacillus* spp. on the growth, hemato-serological, and intestinal microbiota indices of Caspian brown trout (*Salmo trutta caspius* kessler, 1877). *Probiotics and Antimicrobial Proteins* 11, 198-206.
- Akhtar, P., Ian-Gray, J., Cooper, T.H., Garling, D.L., Booren, A.M., 1999. Dietary pigmentation and deposition of  $\alpha$ -tocopherol and carotenoids in rainbow trout muscle and liver tissue. *Journal of Food Science* 64, 234-239.
- Al-Salif, S.S.A., Abdel-Raouf, N., El-Wazanani, H.A., Aref, I.A., 2014. Antibacterial substances from marine algae isolated from Jeddah coast of Red Sea, Saudi Arabia. *Saudi Journal of Biological Sciences* 21, 57-64.
- AOAC, 1993. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, p.
- AOAC, 2007. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. AOAC International, Arlington, p.
- Barrow, C., Shahidi, F., 2008. Marine Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, United States, 196 p.

- Behnke, R.J., 1992. Native Trout of Western North America. American Fisheries Society, Monograph 6, 275 p.
- Boggio, S.M., Hardy, R.W., Babbitt, J.K., Brannon, E.L., 1985. The influence of dietary lipid source and  $\alpha$ -tocopherol acetate level on product quality of rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *Aquaculture* 51, 13-24.
- Brewer, M.S., 2011. Natural antioxidants: sources, compounds, mechanisms of action, and potential applications. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 10, 221-247.
- Chen, C.C., Wu, J.K., Lin, H.W., Pai, T.P., Fu, T.F., Wu, C.L., Tully, T., Chiang, A.S., 2012. Visualizing long-term memory formation in two neurons of the *Drosophila* brain. *Science* 335, 678-685.
- Collier, H.B., 1944. The standardizations of blood hemoglobin determinations. *Canadian Medical Association Journal* 50, 550-552.
- Connel, J.J., 1975. Control of Fish Quality. Fishing News Books, London, 223 p.
- Cowey, C.B., Adron, J.W., Youngson, A., 1983. The vitamin E requirement of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) given diets containing polyunsaturated fatty acids derived from fish oil. *Aquaculture* 30(8), 93-95.
- Cui, Y., Ye, O., Wang, H., Li, Y., Yao, W., Qian, H., 2014. Hepatoprotective potential of *Aloe vera* polysaccharides against chronic alcohol-induced hepatotoxicity in mice. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 94, 1764-1771.
- Dong, S., Zeng, M., Wang, D., Liu, Z., Zhao, Y., Yang, H., 2008. Antioxidant and biochemical properties of protein hydrolysates prepared from silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). *Food Chemistry* 107, 1485-1493.
- Egan, H., Hirk, R.S., Sawyer, R., 1997. Pearson's Chemical Analysis of Food. Longman Scientific and Technical, p.
- Frigg, M., Prabucki, A.L., Ruhdel, E.U., 1990. Effect of dietary vitamin E levels on oxidative stability of trout fillets. *Aquaculture* 84, 145-158.
- Gatta, P.P., Prini, M., Testi, S., Vignola, G., Monetti, P.G., 2000. The influence of different levels of vitamin E on sea bass *Dicentrarchus labrax* flesh quality. *Aquaculture Nutrition* 6, 47-52.
- Ghomi, M.R., Nikoo, M., Heshamatipour, Z., Jannati, A., Ovissipour, M., Benjakul, S., Hashemi, M., Faghanilangroudi, H., Hasandoost, M., Jadiddikhani, D., 2011. Effect of sodium acetate and nicin on microbial and chemical change of cultured grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) during refrigerated storage. *Journal of Food Safety* 31, 169-175.
- Hamre, 2011. Metabolism, interactions, requirements and functions of vitamin E in fish. *Aquaculture Nutrition* 17, 98-115.
- Howell, E.E., Foster, P.G., Foster, L.M., 1988. Construction of a dihydrofolate reductase-deficient mutant of *Escherichia coli* by gene replacement. *Journal of Bacteriology* 170, 3040-3045.
- Klontz, G.W., 1994. Fish Hematology. In: Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Rowley, A.F., Kelikoff, T.C., Kaattari, S.L., Smith, S.A. (Eds.), Techniques in fish immunology. SOS Publications Fair Haven, New Jersey, pp. 121-132.
- Klontz, W.G., 1991. A Manual for Rainbow Trout Production on the Family-Owned Farm. Nelson and Sons, Inc., Utah, 113 p.
- Kritchevsky, D., 1994. Stearic acid metabolism and atherogenesis: History. *The American Journal of Clinical Nutrition* 60, 997-1001.

- Kubiriza, G., Ámason, J., Sigurgeirsson, Ó.I., Hamaguchi, P., Snorrason, S., Tomasson, T., Thorarensen, H., 2016. Dietary lipid oxidation tolerance of juvenile Arctic charr (*Salvelinus alpinus*) and Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture* . . . . .
- Lozano, A.R., Borges, P., Robaina, L., Betancor, M., Hernández-Cruz, C.M., Romero-García, J., Vergara, J.M., Izquierdo, M., 2017. Effect of different dietary vitamin E levels on growth, fish composition, fillet quality and liver histology of meagre) *Argyrosomus regius* *Aquaculture* 468, 175-183.
- Pan, C.H., Chien, Y.H., Hunter, B., 2003. The resistance to ammonia stress of *Penaeus monodon* Fabricus juvenile fed diets supplemented with astaxanthin. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 29 (7),107-118..
- Pikul, J., Leszczynski, D.E., Kummerow, F.A., 1989. Evaluation of three modified TBA methods for measuring lipid oxidation in chicken meat. *Journal of Agriculture and Food Chemistry* 37, 1309-13013.
- Rahimi, M., Ahmadvand, S., Eagderi, S., Shamohammadi, S., 2015. Effects of vitamin C and E administration on leukocyte counts in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Nutrition and Health* 1, 1-5.
- Rawling, M.D., Merrifield, D.L., Davis, S.J., 2009. Preliminary assessment of dietary supplementation of sangrovit of red tilapia (*Oreochromis niloticus*) growth performance and health. *Aquaculture* 294, 118-122.
- Sargent, J.R., Tocher, D.R., Bell, J.G., 2002. The lipids. In: Halver, J.E., Hardy, R.W. (Eds.), *Fish Nutrition*. Academic Press, San Diego, pp. 182-246.
- Sargent, J.R., Tocher, D.R., Bell, J.G., 2002. The lipids. In: Halver, J.E., Hardy, R.w. (Eds.), *Fish Nutrition*. Academic Press, London, pp. 181-257.
- Secombes, C.J., 1996. The non-specific immune system: cellular defense. In: Iwama, G ,Nakanishi, T. (Eds.), *The Fish Immune System: Organism, Pathogens and Environment*. CA Academic Press, San Diego, pp. 63-103.
- Sigurgisladottir, S., Parrish, C.C., Ackman, R.G., Lall, S.P., 1994. Tocopherol deposition in the muscle of Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Journal of Food Science* 59, 256-259.
- Smith, R.H., 1991. Rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. In: Stolz, J., Schnell, J. (Eds.), *Trout. The Wildlife Series*, Stackpole Books, Harrisburg, pp. 304-322.
- Tanamati, A., Stevanato, F.B., Visentainer ,J.E.L., Matsushita, M., De Souza, N.E., Visentainer, J.V., 2009. Fatty acid composition in wild and cultivated pacu and pintado fish. *European Journal of Lipid Science and Technology* 111, 183-187.
- Tapiero, H., Nguyen Ba, G., Couvreur, P., Tew, K.D., 2002. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) and eicosanoids in human health and pathologies. *Biomedicine and Pahrmacotherapy* 56, 215-222.
- Tocher, D.R., Mourente, G., Van-Der-Eecken, A., Evjemo, J.O., Diaz, E., Bell, J.G., Geurden, I., Lavens, P., Olsen, Y., 20 . \* Effects of dietary vitamin E on antioxidant defense mechanisms of juvenile turbot (*Scophthalmus maximus* L.), halibut (*Hippoglossus hippoglossus* L.) and sea bream (*sparus aurata* L.). *Aquaculture Nutrition* 8, 195-207.
- Uribe, C., Folch, H., Enriquez, R ,Moran, G., 2011. Innate and adaptive immunity in teleost fish: a review. *Veterinari Medicina* 10, 486-503.
- Waagbø, R., Sandnes, K., Sandvin, A., Lie, Ø., 1991. Feeding three levels of n-3 polyunsaturated fatty acids at two levels of vitamin E to Atlantic salmon (*Salmo salar*) growth and chemical composition. *Fisk. Dir. Skr. Ser. Ernaring* 4, 51-63.
- Watanabe, T., Takeuchi, T., Wada, M., Uehara, R., 1981. The relationship between dietary lipid levels and a-tocopherol requirement of rainbow trout. *Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries* 47, 1463-1471.

